

## ¿cómo funciona NEXPLANON?

NEXPLANON es un implante anticonceptivo liberador de hormonas para el uso en mujeres a fin de prevenir el embarazo durante un máximo de 3 años.

NEXPLANON previene el embarazo de varias maneras. La más importante consiste en interrumpir la liberación de óvulos desde el ovario. NEXPLANON también hace más espeso el moco cervical, y este cambio puede evitar que el espermatozoide llegue al óvulo.

NEXPLANON también modifica las paredes del útero.

---

## ¿NEXPLANON funciona tan bien como la píldora?

NEXPLANON tiene una eficacia mayor del 99 % (menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usaron NEXPLANON durante 1 año) en la prevención del embarazo, además de que no es necesario acordarse de tomarlo todos los días. NEXPLANON es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces disponibles.

---

## ¿NEXPLANON es un dispositivo intrauterino?

No, no es un dispositivo intrauterino, ya que se coloca en el brazo, y no en el útero. Sin embargo, al igual que un dispositivo intrauterino, es una opción anticonceptiva de acción prolongada, ya que dura 3 años.

---

## ¿NEXPLANON influirá en mis períodos?

El efecto secundario más frecuente de NEXPLANON es un cambio en su patrón normal de sangrado menstrual. En estudios, 1 de cada 10 mujeres dejó de usar el implante por un cambio desfavorable en su patrón de sangrado. El período puede durar más o menos, o es posible que desaparezca por completo. El tiempo entre períodos puede variar, y también puede experimentar manchado entre los períodos.

---

## ¿quién no debe usar NEXPLANON?

No use NEXPLANON en los siguientes casos:

- Está embarazada o cree que podría estarlo
- Tiene o tuvo coágulos de sangre graves, como coágulos de sangre en las piernas (trombosis venosa profunda), los pulmones (embolia pulmonar), los ojos (ceguera parcial o total), el corazón (infarto de miocardio) o el cerebro (accidente cerebrovascular)
- Tiene una enfermedad hepática o un tumor hepático
- Tiene sangrado vaginal sin motivo aparente
- Tiene o ha tenido cáncer de mama u otro tipo de cáncer sensible a la progestina (una hormona femenina)
- Es alérgica a algún componente de NEXPLANON

Informe a su profesional de la salud si tiene o ha tenido alguna de las afecciones antes mencionadas. Su profesional de la salud puede sugerirle un método anticonceptivo diferente.

Además, hable con su profesional de la salud acerca del uso de NEXPLANON si tiene:

- Diabetes
  - Colesterol o triglicéridos elevados
  - Dolores de cabeza
  - Problemas vesiculares o renales
  - Antecedentes de estado depresivo
  - Presión arterial alta
  - Alergia a los medicamentos que se utilizan para anestésiar (anestésicos) o a los medicamentos que se utilizan para limpiar la piel (antisépticos). Estos medicamentos se utilizarán al colocar o extraer el implante del brazo.
- 

## ¿cómo es la extracción de NEXPLANON?

El profesional de la salud le puede extraer NEXPLANON en cualquier momento durante el período de 3 años; la extracción debe hacerse antes del final del tercer año. Para obtener más información sobre cómo se extrae NEXPLANON, [haga clic aquí](#).